

PARKINSON

(¡Aún en proceso de investigación, pero con avances importantes comprobados!)

PROLOGO. *Este proceso si ha sido probado con éxito desde hace varios.* Antes de leer cualquiera de los tratamientos debe conocer acerca del TENS(Transcutaneous Electrical Neuro Stimulator) el cual es equivalente a la medicina, y ver sus características leyendo el archivo correspondiente contenido en este mismo paquete, y comprarlo por medio de internet, sólo teniendo cuidado que dentro de los “Modos de estimulación” contenga la opción: “Normal o Constante” . En caso de no lograr una cura por este tratamiento debe ver a su médico tratante.

INTRODUCCIÓN

“Las áreas cerebrales involucradas en el control del movimiento son principalmente el cerebelo y la corteza motora. El cerebelo coordina los movimientos, incluyendo el equilibrio y la postura, y es crucial para aprender nuevas secuencias motoras. La corteza motora, ubicada en el lóbulo frontal, inicia los movimientos voluntarios. Además, otras estructuras como los ganglios basales y el tronco encefálico también juegan un papel importante en la regulación del movimiento.”¹

“Al analizar las características sistémicas del cerebro, el más complejo del universo, vi que la única forma de tratarlo era de una manera integral o global, sin tener que descifrar los subprocesos involucrados dañados y sus características específicas, lo cual me podría requerir miles de vidas. Conforme pasó el tiempo fui tratando cada enfermedad independientemente, logrando frutos parciales exitosos, como frenar el avance de la enfermedad del Parkinson en seis años, pero no parar el movimiento involuntario de extremidades; o quitar un dolor frecuente pero intenso en persona con Alzheimer pero sin poder valorar su efecto en la pérdida de memoria, o eliminar las crisis epiléptica en paciente tratado con tres medicamentos y 221 crisis al mes, a menos de seis en el mismo periodo, pero no terminar diciendo adiós para siempre a la enfermedad. Al final vi que coincidían todos ellos(epilepsia,

¹ Ref. Internet en el día 6/5/2026:

https://www.google.com/search?q=partes+del+cerebro+involucradas+en+el+movimiento&rlz=1C1ALOY_esMX943MX943&oq=partes+del+cerebro+involucradas+en+el+movimiento&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAlQIRigAdIBCjI2OTkyajBqMTWoAgiwAgHxBXeVBeDoUG4y8QV3lQXg6FBuMg&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Alzheimer y Parkinson) en los aspectos fundamentales de su procedimiento para curarlas y que podrían ponerse en uno sólo, con ligeros cambios . “

El diseño final tomó en cuenta los resultados mostrados en la imagen que muestra las curvas de resonancia entre las distintas partes del cerebro; esto es, la facilidad con la que lo penetra la corriente eléctrica, como se muestra en la siguiente figura 1 : De ella se observa que la mayor resistencia a la penetración se da entre ambos oídos.




Figura 1. Curvas de resonancia usando la frente, oídos y nuca.

CREACIÓN DE UN CABLE PARA CONECTAR DOS PADS A UNA SOLA POLARIDAD

La construcción es muy sencilla y el tratamiento necesitará de dos cables similares al cual llamaremos “**Duplex**” elaborados siguiendo los pasos a continuación:

1. Conseguir un trozo de cable y pelarlo en ambas extremidades y al centro del mismo como se muestra en la imagen 0.
2. Introducir cada extremo en la entrada de ambos pads.
3. Conseguir un cable tipo caimán en cualquier tienda de equipo electrónico y conectar un extremo al centro del cable.
4. Unir la otra boca o extremo del cable caimán con una punta del TENS como se muestra ven la figura 2; con eso se consigue dar la misma polaridad a ambos pad - **Duplex**




Figura 2. Unión de dos pads a una misma polaridad - Duplex.

I. PRIMERA SEMANA

“Se aplica veces separados por un día, por ejemplo lunes y miércoles o martes y jueves “.

PARTE FRONTAL DEL CEREBRO.

TAMAÑO DE PADS.

- a. **En los conductos auditivos.** Usar pads redondos de 2 ó 2.5 centímetros de diámetro enrollado, pues son fáciles de penetrar en el oído ; también pueden usarse redondos de 3.5 centímetros ya que son más comunes en el mercado y no se requiere penetrarlos totalmente , basta que entre la mitad o tercera parte en el conducto auditivo y presionar el pad con el dedo por fuera del oído sin tocarlo.

En la parte superior de la cabeza . Usar un pad rectangular de 4 x 4 ó 5 x 5 cm .

INTENSIDAD DE CORRIENTE

En cada posición se incrementa la intensidad hasta que la persona perciba su presencia, y la disminuya ligeramente hasta dejar de sentirla o de tener dolor, esa es la intensidad idónea para tratamiento .

El pad en la parte superior de la cabeza va a la altura de los oídos y al centro; se debe humedecer la parte en la que va ya que el pelo no permite el paso de la corriente hacia la piel si no se humedece rociando con un poco de agua y con vinagre en ella para aumentar la conductividad de ésta.






Figura 3a, Tratamiento entre ambos oídos y parte superior de la cabeza ; 3b. entre ambos oídos y frente .

“TRATAMIENTO DEL CEREBELO”

La corriente siempre va del electrodo positivo al negativo, esto es, del pad rojo al negro; en el tratamiento eléctrico no importa qué polaridad (positiva o negativa) se coloca en una parte del cuerpo, lo relevante para el tratamiento





es que la corriente cruce la parte dañada del cuerpo para sanarla.

Por ejemplo, en la figura (4.a) se coloca un par de pads en las fosas nasales usando un cable Duplex como se muestra en la

, esto obliga a la corriente a penetrar por ambas fosas y ascender por el par terminal para penetrar directamente al cerebro.

recorre ambos hemisferios cerebrales y va a los dos pads colocados en la nuca usando el otro cable Duplex cubriendo toda ella : izquierda, derecha y parte central (fig 4). Si no desea hacer

los cables dúplex, entonces puede hacerlo separadamente en cada lado colocando un pad en una fosa nasal y el otro en la nuca del mismo lado y similarmente en el otro lado.



(a)




Figura 4a. Trayectoria de la corriente con pads en fosas nasales y ambos lados de la nuca.(b). Trayectoria de la corriente hasta el final de la columna cuando quitan los pads de la nuca y se coloca un pad al final de la columna. Este tratamiento requiere de dos cables como los mostrados en la figura 2.

TRATAMIENTO:

Intensidad de corriente.

De manera similar a casi en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, bajar muy ligeramente ésta hasta dejar de percibirla y tratar en esa posición o intensidad.

TAMAÑO DE PADS.

- b. **En las fosas nasales.** Usar pads redondos de 2 ó 2.5 centímetros de diámetro enrollado, pues son fáciles de penetrar; también pueden usarse redondos de 3.5 centímetros ya que son más comunes en el mercado y no se

requiere penetrarlos totalmente , basta que entre la mitad o tercera parte a la fosa nasal y presionar el pad con el dedo por fuera de la nariz sin tocarlo.

Tiempo de tratamiento:

1. - **FIGURA 3a**, *Tratamiento entre ambos oídos y parte superior de la cabeza 5 mins;*
3b. entre ambos oídos y frente - 5 minutos .

Estimular :

- a. *Durante 5 minutos según figura 4^a*(entre fosas nasales y nuca) ,
y
- b. *Durante 5 minutos según figura 4b*(entre fosas nasales y **fin de columna**) .

TIEMPO TOTAL – 35 MINS.

II. SEGUNDA SEMANA – Sólo dos días separados por un día día .

TRATAMIENTO DE LA GLÁNDULA GLÁNDULA TIROIDES

La literatura señala que una de las causas del movimiento involuntario de extremidades se debe a un mal funcionamiento de la tiroides, de ahí su inclusión con objeto de dar un tratamiento integral a la enfermedad.

TRATAMIENTO.

Este es realmente sencillo ya que basta con colocar un pad en la lengua y el otro en la bases del cuello como se indica en la figura 5.




Figura 5. Tratamiento de la glándula tiroides.

Tiempo de tratamiento.

Usar 10 minutos cada día, durante tres días continuos, esto será suficiente.

Tamaño de pads.

Usar pads cuadrados de 5 x 5 cm.

Intensidad de corriente.

De manera similar a casi en todos los procedimientos, ir aumentando la intensidad de corriente hasta percibirla, bajar muy ligeramente ésta y dejarla en esa posición o intensidad.

ABDOMEN

La literatura señala al intestino , por algunos científicos llamado el segundo cerebro, como el causante de crear la substancia que aparece en la células del cerebro en casos de Parkinson llamada proteína desdoblada α -sinucleína (alfa-sinucleína), y este es por tanto nuestro objetivo en el tratamiento global que deseamos para curar el Parkinson




Figura 6. Posición de pads en la estimulación del abdomen.

¡ Cada opción se trata por 5 minutos a la misma intensidad de corriente señalada anteriormente ¡